INFORMACIÓN
IMPORTANTE DESPUÉS DE PONERSE
LA VACUNA DEL COVID-19

Asegúrese de monitorear sus síntomas y continúe tomando las medidas preventivas en contra del COVID-19. Los efectos secundarios son parecidos a los de la gripe y tal vez puedan hasta afectar sus actividades diarias, pero deben desparecer en algunos días. Los efectos secundarios comunes de la vacuna incluyen:

Para su brazo donde recibió la inyección:

- **Dolor**
- **Hinchazón**

En su cuerpo puede presentar:

- **Fiebre**
- **Escalofríos**
- **Cansancio**
- **Dolores de cabeza**

Por favor recuerde

Con la mayoría de las vacunas del COVID-19, necesitará 2 dosis para que funcionen adecuadamente. Asegúrese de recibir la segunda dosis incluso si tiene efectos secundarios después de haber recibido la primera. Se necesita tiempo para que su cuerpo desarrolle protección después de cualquier tipo vacuna. Es posible que las vacunas del COVID-19 que requieren 2 dosis no lo protejan hasta una semana o dos después de su segunda dosis.

Por favor, continúe usando mascarilla/cubrebocas cuando se encuentre con otras personas que no vivan con usted, practique el distanciamiento social (6 pies o dos metros), lávese las manos y quédese en casa tanto cuando sea posible.

Cuando contactar a su médico:
- Contacte a su médico si el enrojecimiento o la sensibilidad en el lugar donde recibió la vacuna aumenta después de 24 horas.
- Contacte a su médico si sus efectos secundarios le preocupan o no desaparecen después de unos días

vsafe.cdc.gov

V-safe es una herramienta para teléfonos inteligentes o smartphones después de recibir la vacuna. Su participación ayuda a garantizar la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 – para usted y para todos. ¡Regístrese en este enlace: vsafe.cdc.gov en donde puede incluir su información sobre la vacuna y empezar a recibir verificaciones personalizadas de salud!

PROCEDIMIENTOS PARA DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN DEL COVID-19

Ahora que ya recibió la vacuna del COVID-19, **debe esperar 15 minutos** en la zona designada antes de salir de las instalaciones (30 minutos si tiene antecedentes de reacciones alérgicas).

Toque el claxon para obtener ayuda si experimenta:

- Urticaria: áreas rojas en la piel alrededor de todo el cuerpo
- Hinchazón que no sea cerca del lugar donde se le administro la inyección
- Picazón en el cuerpo
- Tos
- Ruidos respiratorios
- Debilidad en todo el cuerpo
- Si siente que se va a desmayar
- Opresión en la garganta
- Náuseas o vómito
- Aumento de la frecuencia cardíaca

¡HCPH quiere que usted se mantenga sano y seguro!

Visite www.hcphtx.org o www.readyharris.org para obtener más información sobre el COVID-19.

Si cree que podría estar teniendo una reacción alérgica severa después de abandonar el lugar donde se le administro la vacuna, busque atención médica inmediata llamando al 911